

89 - Mordida cruzada anterior na dentição decídua

*Heloisia Gandolfi SPILLA, Dirceu Barnabé RAVELLI, Taísa Boamorte RAVELLI,
Denise Rocha GOES, Luana Paz Sampaio DIB*

Como proceder? A mordida cruzada anterior é uma má oclusão caracterizada por um relacionamento anormal dos incisivos, ou seja, consiste numa condição em que um ou mais dentes anteriores superiores se encontram posicionados lingualmente aos inferiores na relação de oclusão. Sua prevalência na fase da dentição decídua é de 0.3% a 16%, sendo mais freqüente em indivíduos da raça negra do que em indivíduos da raça branca. A sua etiologia está relacionada a hereditariedade, inclinação anormal dos incisivos, contatos prematuros, retrognatismo maxilar e prognatismo mandibular. Esta má oclusão deve ser tratada o mais cedo possível, no intuito de evitar um crescimento anormal dos componentes esqueléticos e dentoalveolares, pois ela não sofre auto-correção. A mordida cruzada anterior pode ser caracterizada por um componente esquelético, dentário e funcional; e o seu tratamento está na dependência do tipo de tecido envolvido, bem como da idade do paciente. O objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico de uma paciente que apresentava uma mordida cruzada anterior que foi tratada com o aparelho Progênico.