

Granuloma Piogênico de grandes proporções

Hassumi, J.S.; Masocatto, D.C.; Oliveira, M.M.; Gaetti-Jardim, E.C.; Silva, H.C.L.; Mendonça, J.C.G.

O granuloma piogênico é considerado um processo proliferativo reacional não neoplásico. Na boca é comum em gengiva, mas, pode atingir outras regiões. Apresenta-se como lesão nodular, lobulada ou plana, pediculada e, por vezes, de superfície ulcerada de coloração vermelha e facilmente sangrante. Como características histológicas, evidencia-se tecido de granulação proeminente com intensa proliferação endotelial e espaços vasculares. Paciente sexo feminino, 45 anos, melanoderma, a qual apresentava massa tumoral de aproximadamente 7 cm em mucosa de rebordo alveolar região dos dentes 36 e 37 com evolução progressiva de um ano, arroxeadada, fácil sangramento. Compareceu ao Serviço de Emergência do NHU/UFMS com hemorragia abundante em lençol em fundo de rebordo alveolar provocado por trauma mecânico sendo atendida pela equipe de CTBM. Foi realizada hemostasia por meio da compressão digital com gaze e sutura em massa. Em um segundo tempo realizou-se exérese total da lesão em centro cirúrgico sob anestesia local, acrescida as orientações de cuidados com a higiene, controle de placa bacteriana e encaminhamento para tratamento periodontal. Em virtude das dimensões do tumor apresentado, é relevante o conhecimento de sua etiopatogenia bem como as possíveis formas de tratamento no intento de evitar complicações futuras.

Palavras-chave: Granuloma piogênico; diagnóstico; cirurgia.



4º Congresso Odontológico de Araçatuba
34ª Jornada Acadêmica "Prof. Dr. José Eduardo Rodrigues"
10º Simpósio de Pós-Graduação "Prof. Dr. Alício Rosalino Garcia"
3º Encontro de Técnicos em Laboratório "Rosimeire de Oliveira M. Gon"
6º Encontro do C.A.O.E.

21 a 24 de maio de 2014
Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP

Presidente: Prof. Dr. Fellippo Ramos Verri
Vice-Presidente: Prof. Dr. Marcelo Coelho Goiato

367 resumos apresentados