

Recuperação de espaço biológico no arco dentário durante a dentição mista – relato de caso clínico

Nicole Ranzani BERNAL, Felipe Henrique CORRÊA, Gabriela Leite PEDROSO,
Matheus Urias Cruz SANTOS, Mariah Carboni MENDES, Maria Bernadete Sasso STUANI

Introdução: Os problemas de espaço em dentição mista normalmente são consequências da inexistência de espaço nas arcadas para o correto alinhamento dentário e de interferências na cronologia de erupção dentária. Desta forma, o cirurgião dentista deve estar atento a todos os fatores responsáveis pela perda de espaço no arco dentário, e aos métodos para recuperar este espaço caso tenha sido perdido precocemente, e assim, alcançar o sucesso junto dos seus pacientes. **Objetivo:** Realizar uma revisão de literatura e mostrar uma abordagem clínica ao tratamento de um caso de perda precoce de molares decíduos inferiores, com a perda de espaço no arco dentário. **Conduta Clínica:** Paciente M.C.V. lecoderma, do gênero feminino, 7a 8m de idade, acompanhado da responsável, procurou a Disciplina de Ortodontia da FORP-USP, Departamento de Clínica Infantil. A paciente apresentava-se na fase de dentição mista, com oclusão de Classe III, subdivisão esquerda. Clinicamente apresentava higiene oral regular, linha média dentária e facial coincidentes, sobremordida acentuada e perda precoce do segundo molar decíduo inferior esquerdo com migração acentuada do primeiro molar permanente. Como plano de tratamento foi preconizado um aparelho ortodôntico removível inferior com parafuso expansor e placa de mordida superior. **Resultados:** Houve a recuperação do espaço perdido no arco dentário referente ao segundo pré-molar. **Conclusão:** Deve ser levado em consideração que o dispositivo prescrito tem que ser o mais simples possível, sem nunca esquecer que a colaboração da paciente foi de extrema importância para os resultados atingidos.

DESCRITORES: Ortodontia interceptadora; movimentação dentária; dentição mista.