

Saúde bucal da população idosa no Brasil segundo inquéritos nacionais de saúde bucal

Caroline Milani CALDEIRA, Nancy Sayuri UCHIDA, Maura Sassahara HIGASI,
Maria Luiza Hiromi Iwakura KASAI, Lírian Adriana Maria Pereira da SILVA, Tânia Harumi UCHIDA

Introdução: A população idosa requer uma atenção diferenciada dos profissionais da odontologia, visto que a cavidade bucal pode apresentar mudanças decorrentes do envelhecimento, em virtude da cárie dentária, doença periodontal, perda de grande número de dentes, dentre outras patologias. O Programa Nacional de Saúde Bucal utiliza o Projeto SB Brasil para construir um perfil epidemiológico da população brasileira, sendo a principal estratégia de vigilância em saúde bucal e de ações preventivas e reabilitadoras. **Objetivo:** Foi analisar o perfil de saúde bucal da população idosa no Brasil. **Método:** Trata-se de um estudo ecológico longitudinal, os dados coletados foram obtidos por meio de Inquéritos Nacionais de Saúde Bucal (INSB) - SB Brasil dos anos de 1986, 1996, 2003 e 2010. Foram analisadas as variáveis doença periodontal mensurada pelo Índice Periodontal Comunitário (CPI) e cárie dentária pelo índice CPO-D (dentes permanentes cariados, perdidos e obturados) da população na faixa etária dos 65 aos 74 anos de idade. **Resultados:** O INSB de 1986 não disponibilizou o número oficial de participantes da faixa etária referida, em 1996 os indivíduos da terceira idade não fizeram parte da amostragem da pesquisa. O número de idosos que participaram em 2003 foi 5.349 e 2010 foi de 7.509. O índice CPO-D da população idosa em 1986 foi de 27,2; em 2003, foi de 27,8 e em 2010, foi de 27,53. Conforme o índice CPI, em 2003, 7,89% apresentavam dentes hígidos; 3,27% sangramento gengival; 21,74% biofilme dentário (BD); 4,45% bolsas periodontais (BP) rasas e 1,85% BP profundas. Em 2010, 7,89% apresentavam dentes hígidos; 0,2% sangramento gengival; 4,2% BD; 2,5% BP rasas e 0,8% BP profundas. **Conclusão:** Assim, pode-se evidenciar melhorias no índice CPI, principalmente nos aspectos relacionados ao sangramento gengival, biofilme dentário e bolsa periodontal rasa e profunda. Quanto ao índice CPO-D, os resultados apresentados permaneceram praticamente inalterados ao longo dos inquéritos realizados.

DESCRITORES: Idoso; odontologia para idosos; saúde bucal.