

## Reestruturação de malar com preenchimento dérmico de ácido hialurônico: relato de caso

Larissa Maria Regis da SILVA, Marina de Matos MADRUGA, Marivone Batista Ribeiro POLESSO, Thallyson Alves CAMPELO, Carla Rafaela Gomes da SILVA

**Introdução:** A percepção de beleza do rosto é subjetiva e pode variar. Contudo, são ditas como características pertencentes à face jovem a projeção malar e bochechas cheias. Para equilibrar o envelhecimento natural da face tem-se utilizado amplamente os preenchimentos dérmicos, em especial por ser uma técnica minimamente invasiva, cujos resultados são previsíveis e podem ser reversíveis. O ácido hialurônico é o preenchedor rotineiramente eleito devido à sua segurança em ser biocompatível, não-imunogênico e não-cancerígeno, bem como pela facilidade de aplicação e resultados estéticos agradáveis. A volumização do meio da face é ímpar, pois esta região tem um impacto relevante na aparência das pessoas. **Objetivos:** Descrever o caso clínico de uma paciente feminina, de 47 anos de idade, que realizou preenchimento dérmico da região de malar. **Material e método ou Conduta Clínica:** Paciente ATLL, feminino, 47, melanoderma, procurou atendimento, com a queixa principal “quero tratar meu bigode chinês” (SIC). Ao exame observou-se cedimento dos coxins de gordura, o que favorecia a perda de sustentação e volume na região, assim determinando os sulcos nasojugal e nasolabial. Optou-se por realizar o preenchimento dérmico de malar com 02 seringas de 1ml de ácido hialurônico reticulado Rennova® Lift para reestruturação do terço médio da face, através de retroinjeções e movimento em leque, precedido por anestesia local com lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 no ponto de inserção da cânula 22G e pertuito com agulha hipodérmica 21G. **Resultados:** Ao final do tratamento observou-se tanto melhora no sulco nasojugal, quanto na fossa lacrimal e sulco nasolabial, promovendo então um rejuvenescimento à sua face. **Conclusão:** O tratamento para reestruturação de malar com preenchimento dérmico de ácido hialurônico obteve resultados satisfatórios. A técnica e material escolhidos mostraram-se seguros, não apresentando intercorrências. Os resultados permanecem adequados mesmo após 11 meses da aplicação.

**DESCRIPTORIOS:** Preenchedores dérmicos; Ácido hialurônico; Estética.