

Associação das técnicas mediata e *inside-outside* para clareamento de dente não vital em paciente com histórico de traumatismo dentário

Renata Gomes Franco Fernandes LOPES, Ana Beatriz Villar MEDEIROS,
João Pedro Andrade RANGEL, Rodolfo Xavier Sousa LIMA, Yanna de Omena SOARES

Introdução: O escurecimento dental é uma sequela comumente observada em pacientes que sofreram traumatismos dentários (TD) devido a falhas durante os procedimentos endodônticos, entre outras etiologias. Dentre as possibilidades de clareamento, a associação de técnicas tem se mostrado eficiente para dentes não vitais. **Objetivo:** Trata-se do relato de um caso de associação da técnica Walking bleach (mediata) e aplicação de gel clareador usando a técnica inside-outside em consultório para clareamento de dentes anteriores de paciente com histórico de TD e tratamento endodôntico (TE) insatisfatório. **Conduta clínica:** A técnica Walking bleach (mediata) consistiu na confecção de tampão cervical 3 mm abaixo da Junção Amelo-Cementária (JAC) com resina flow no elemento 21 e aplicação de Perborato de Sódio 20%. Foram realizadas seis sessões com intervalos de sete dias. Posteriormente, duas sessões de clareamento externo foram realizadas com gel de Peróxido de Hidrogênio 35% onde foi feita a aplicação dentro da câmara pulpar e na face vestibular do dente, também com intervalo de sete dias, seguido de restaurações definitivas com resina composta (RC) 15 dias após a última sessão clareadora. **Resultados:** A associação das técnicas de clareamento se mostrou vantajosa para recuperar a cor dente 21 e favoreceu o procedimento restaurador e restabelecimento da estética. **Conclusão:** A associação das técnicas mediatas e aplicação externa/interna de gel clareador para clareamento de dentes não vitais se mostrou eficiente no caso do paciente com histórico de TD e TE insatisfatório.

DESCRIPTORIOS: Clareamento dental; Dente não vital; Traumatismo dentário.