

Queilite actínica com displasia leve: relato de caso clínico

Naiara Alves MAREGA, Andreia BUFALINO, Cláudia Maria NAVARRO, Jorge Esquiche LEÓN,
Camila de Oliveira BARBEIRO, Mariana Paravani PALAÇON, Héric de Souza CAMARGO,
Elaine Maria Sgavioli MASSUCATO

Introdução: A Queilite Actínica (QA) é uma lesão que acomete a região da semimucosa labial, principalmente inferio, onde há exposição frequente e exacerbada de raios solares (radiação actínica) um fator de risco para o seu aparecimento. A forma crônica desta lesão se apresenta como uma atrofia da semimucosa, perda de delimitação do lábio com aumento de volume difuso dessa região de delimitação entre lábio e região cutânea. Associadas a essa lesão podem surgir alterações em forma de áreas leuco e/ou eritroplásicas além de perda de elasticidade. **Objetivos:** Apresentar um caso clínico de queilite actínica e discutir suas principais características e compará-las com a literatura para a detecção precoce e o diagnóstico desta lesão. **Paciente** do gênero masculino, com 73 anos de idade, ex-tabagista, leucoderma, foi atendido em nosso Serviço queixando-se de “mancha esbranquiçada em região de lábio inferior”. Ao exame clínico foi observado perda de delimitação labial com atrofia e placa branca não raspável, de limites irregulares e superfície rugosa. Foi realizada biópsia incisional. **Resultados:** O resultado histopatológico da biópsia confirmou características microscópicas de queilite actínica com displasia epitelial de grau leve. A conduta diante do caso foi de orientar o paciente quanto à natureza da lesão, quanto ao uso de chapéu de aba larga quando se expuser ao sol e uso de protetor labial além do acompanhamento periódico. **Conclusão:** Salienta-se a importância do cirurgião-dentista na precisão do diagnóstico precoce e no tratamento e acompanhamento destas lesões por ser estar entre as desordens potencialmente malignas orais.

DESCRITORES: Queilite; Atrofia; Diagnóstico.