

Tratamento cirúrgico para recobrimento radicular de uma recessão gengival: relato de caso

Geise Bueno PAIVA, Vitória de Paula SILVA, Jaqueline Dutra OLIVEIRA,
Maria Eduarda de Souza CARDOSO, Joyce Aparecida VILELA, Mariana Vieira GUAGNELI,
Gabrielle Aparecida SILVA, Francisco Guilherme TERSI

Introdução: A recessão do tecido marginal consiste na exposição da superfície da raiz quando a margem gengival desloca-se em sentido à junção cimento-esmalte. Desse modo, problemas estéticos, sensibilidades radiculares e cáries surgem devido à essa patologia. A etiologia é multifatorial, sendo de origem predisponente e desencadeante. Essa patologia apresenta algumas classificações de acordo com Miller e Cairo para determinar os graus de severidades das recessões, auxiliando no prognóstico e plano de tratamento. **Objetivos:** O presente trabalho possui o a finalidade de relatar sobre a eficiência da técnica do enxerto conjuntivo para o recobrimento radicular em caso de uma recessão gengival. **Material e método ou conduta clínica:** Paciente sexo masculino, 50 anos de idade, saudável. Compareceu ao consultório com queixa estética. Durante o exame clínico, notou-se a presença de lesões cervicais não cáries e recessão gengival extensa na vestibular do dente 23 apresentando restauração insatisfatória classe V. A classificação dessa recessão de acordo com Miller é do tipo II e de Cairo tipo 1 (RT1). Foram realizadas anestésias infiltrativas na vestibular e no palato para anestésiar as áreas receptoras e doadoras. Iniciou-se pela remoção da restauração e acabamento. Uma incisão de dupla papila na área receptora foi realizada por vestibular com uma lâmina 15C seguido pelo descolamento tecidual. Com o auxílio de um bisturi de duas lâminas, realizou-se a remoção do enxerto do palato, seguido pela sutura em x com fio reabsorvível. Após isso, Iniciou-se a desepitelização e adaptação do enxerto no sítio. Foram feitas suturas com fio reabsorvível para adaptação e cicatrização do enxerto. **Resultados:** O pós operatório foi satisfatório, o paciente apresentou boa cicatrização do sítio e melhora do quadro, restabelecendo a função e a estética. **Conclusão:** Conclui-se que o tratamento cirúrgico pela técnica do enxerto conjuntivo no caso de recessão gengival é efetivo quando associado a um correto diagnóstico e plano de tratamento.

DESCRITORES: Diagnóstico; Patologia; Cicatrização.