

6 - A importância da gengiva marginal inserida para manutenção de prótese implanto-suportada

***RIBEIRO, Ana Lúcia Roselino; TSUJI, Fernanda; MUÑOZ-CHÁVEZ,
Alejandro; ARAUJO, Vanessa Siqueira; MUÑOZ-CHÁVEZ, Oscar Fernando***

A previsibilidade a longo prazo dos implantes dentais e próteses sobre implantes depende da saúde contínua dos tecidos periimplantares mole e duro. A saúde do tecido mole deve ser alcançada através de grande obediência por parte do paciente no que se refere a um regime de remoção de placa, o que é facilitado quando apresenta gengiva marginal inserida. Nesse sentido, foi proposto a demonstração de um caso que se apresentou na Clínica Integrada da Faculdade de Odontologia de Araraquara-UNESP com 04 implantes inferiores já instalados e a necessidade de colocação de uma prótese parafusada tipo protocolo sobre os mesmos. Porém, após análise clínica constatamos a presença de tecido mucoso ao redor dos implantes, que poderia dificultar a manutenção de higiene após a conclusão do caso. Portanto, julga-se válido a realização de um aprofundamento de sulco vestibular associado a um enxerto gengival livre, eliminando assim interferências e contribuindo para longevidade do caso. Realizada a etapa cirúrgica e após a cicatrização dos tecidos, conclui-se a confecção da prótese implanto-suportada ressaltando ao paciente os métodos adequados para a manutenção da higiene para garantir o sucesso do tratamento.