

## **8 - Mesiodens, importância do diagnóstico e tratamento**

***OLIVEIRA, Ana Luísa Botta Martins de; OLIVEIRA, Caio Sérgio Botta Martins de; RÉ, Estefânia de Matos; JOSGRILBERG, Érika Botelho; HEBLING, Josimeri***

Durante as fases iniciais da formação dentária os distúrbios de desenvolvimento podem resultar em anomalias, dentre as quais se destacam os dentes supranumerários. Estes são resultantes de malformações durante o estágio de iniciação e proliferação do desenvolvimento dentário, tanto da dentição decídua quanto da permanente. O mesiodens é o supranumerário mais freqüente (80% em média), sendo caracterizado por sua localização na região ântero-superior, entre os incisivos centrais superiores e por apresentar um formato conóide e de raiz curta. Sua prevalência é maior para o gênero masculino sobre o feminino (proporção 2:1). O presente trabalho relata casos de pacientes da Clínica Infantil da Faculdade de Odontologia de Araraquara-UNESP que apresentavam esta anomalia associada à formação de diastemas entre os incisivos centrais e foram submetidos ao tratamento cirúrgico. O objetivo da remoção deste supranumerário é de prevenir e possibilitar o tratamento de complicações que podem ser ocasionadas por mesiodens como: reabsorção radicular do dente vizinho, problemas de oclusão, formação de cistos, neoplasmas, impactação do dente permanente, formação de diastemas, entre outros. Desta forma, cabe salientar a importância do diagnóstico precoce e tratamento adequado para estas alterações.