

45 - Tratamento cirúrgico de deformidade Classe III com mordida aberta anterior: relato de caso

***SERRA, Elis Cristina Souza; ASSIS, Adriano Freitas de; HOCHULI-VIEIRA, Eduardo;
GABRIELLI, Mário Francisco Real***

A mordida aberta anterior possui múltiplas etiologias, mas pode ser descrita como sendo dentária ou esquelética na sua origem. Um correto diagnóstico é essencial para obter um plano de tratamento adequado: as mordidas abertas dentárias sem grandes discrepâncias tendem a fechar espontaneamente no paciente em crescimento e respondem mais favoravelmente aos tratamentos ortodônticos; já as mordidas abertas esqueléticas frequentemente pioram com o crescimento e normalmente requerem combinação de ortodontia e cirurgia ortognática. Os autores têm por objetivo apresentar um caso clínico de deformidade dento-esquelética Classe III com mordida aberta anterior dando ênfase ao diagnóstico, plano e forma de tratamento, onde foi realizado intrusão posterior da maxila e reposicionamento posterior da mandíbula com giro anti-horário. Referência: 1 - EPKER, B.N.; FISH, L.C. Dentofacial deformities: integrated orthodontic and surgical correction. St. Louis: C.V. Mosby, 1986. 2 - FONSECA, R.J. Oral and maxillofacial surgery. Philadelphia: W.B. Saunders, 2000. 3 - BELL, W.H. Modern practice in orthognathic and reconstructive surgery. Philadelphia: W.B. Saunders, 1992.