

65 - Tratamento da erupção passiva tardia através da cirurgia plástica periodontal para otimização do sorriso

***GIRO, Gabriela; ANDIA, Denise Carleto; MANTOVANI, Rafael Verleigia; MANTOVANI
JUNIOR, Milton; RIBEIRO, Fernando Salimon***

Grande número de pessoas apresentam coroa clinicas curtas, devido à alteração da erupção dos dentes, onde o epitélio juncional não migrou apicalmente, dando uma aparência de dentes curtos e quadrados, interferindo assim na estética do sorriso. O objetivo deste trabalho é o de apresentar o caso da paciente G.G., 25 anos, onde observava-se uma larga faixa de gengiva à mostra durante o sorriso. A paciente relatou já ter sido submetida à cirurgia de gengivoplastia para a correção do problema estético, porém o sorriso ainda não se mostrava harmonioso. Assim, o tratamento proposto foi a realização de uma cirurgia plástica periodontal, com a realização de uma incisão em bisel interno, levantamento de retalho total, realização de osteotomia, para posicionamento da crista óssea 2 mm acima da junção cimento-esmalte, expondo assim, as porções das coroas que estavam recobertas pelo tecido ósseo, e osteoplastia para escultura e diminuição da espessura da porção anterior da maxila. O caso, em acompanhamento de 120 dias, apresentou um resultado bastante satisfatório, otimizando o sorriso com um contorno gengival bastante harmônico.