

## **96 - Tratamento radical de anquilose dento-alveolar severa**

***GONDIM, Juliana Oliveira; PRETEL, Hermes; SANTOS, Karen Slis Raggio;  
CHIARADIA, Afonso Domingos; GIRO, Elisa Maria Aparecida***

A anquilose dentária consiste na união direta entre o cimento e/ou dentina radicular e osso alveolar. Esta anomalia, bastante comum em molares decíduos, leva à condição de infraoclusão do dente afetado, podendo até mesmo gerar sua completa submersão. O diagnóstico precoce favorece a instituição de tratamentos conservadores visando manter o dente em oclusão com o intuito de estimular a reabsorção fisiológica da raiz. Porém, a detecção tardia leva a uma terapêutica mais radical e a alterações que comprometem o desenvolvimento da oclusão. O presente trabalho visa relatar o caso clínico de uma criança de 8 anos de idade, com os segundos molares decíduos do lado direito acometidos por anquilose severa, sendo abordados os aspectos clínicos, radiográficos e histológicos desta anomalia de erupção. Neste caso, a extração dentária foi o tratamento de eleição, fazendo-se necessária a odontosecção com o objetivo de reduzir o trauma cirúrgico. Cabe ressaltar a importância do diagnóstico precoce de alterações de desenvolvimento, assim como a indicação do tratamento correto e o acompanhamento periódico destes casos, visto que podem causar vários problemas de oclusão.