

98 - Cisto dentífero infectado associado a caninos inclusos na mandíbula: relato de caso clínico

CARDOSO, Kátia de Souza; ASSIS, Adriano Freitas de;
SILVA JUNIOR, Eduardo Castro; GABRIELLI, Marisa Aparecida Cabrini;
PEREIRA FILHO, Valfrido Antonio

O cisto dentífero se origina pela separação do folículo da coroa de um dente incluído. É o tipo de cisto odontogênico de desenvolvimento mais comum, compreendendo cerca de 20% de todos os cistos epiteliados dos maxilares, podendo ter diversas formas e tamanhos, variando desde poucos milímetros até lesões bastante amplas. Comumente apresenta-se assintomático, contudo pode-se infectar, presumivelmente por via hematogênica, e estar associado com tumefação e dor. O diagnóstico na grande maioria das vezes se faz pelo exame de imagem. Radiograficamente, esta patologia apresenta-se como uma lesão radiolúcida associada à coroa do dente incluído, bem definida, unilocular, envolvida por uma margem radiopaca. O objetivo deste trabalho é o de revisar o diagnóstico e tratamento dos cistos dentíferos, por meio de um caso clínico de um cisto dentífero infectado, associado aos caninos inferiores inclusos, apresentando fístula cutânea em região submentoniana.