

115 - Prótese parcial com ativação imediata de implantes osseointegrados

***RAMOS, Marcelo Barbosa; AYUB, Eduardo Antonio; PEGORARO, Luis Fernando;
VALLE, Accácio Lins do; MENDONÇA NETO, Tatiany de***

Apesar dos benefícios da implantodontia em duas etapas, os pacientes experimentam o desconforto de prorrogarem por alguns meses a condição edêntula enquanto aguardam o tempo de osseointegração e cicatrização. Vários estudos replicando o sucesso obtido com a osseointegração buscaram a redução do período de espera determinado pelo protocolo original. O restabelecimento imediato da função e estética de uma área edêntula por meio da instalação de implantes e colocação de carga imediata é mais confortável para o paciente e amplamente defendida pela literatura científica (Branemark et al. 1999; Chiapasco et al. 2001; Degidi e Piatelli 2003; Nikellis 2004). Este caso descreve um procedimento de carga imediata em área posterior parcialmente edêntula. O paciente J.S apresentou-se na clínica de pós-graduação da FOB-USP, com dois implantes curtos e parcialmente comprometidos, nas áreas do 34 e 36 onde, devido à sua estabilidade secundária (ISQ 59 e 74), instalaram-se mais dois implantes na região do 35 e 37 (Alvin II-NEODENT®) com ótima estabilidade inicial, ISQ 69 e 75, para distribuir melhor a força mastigatória dessa região. A prótese provisória confeccionada com infra-estrutura metálica para os dentes 34 ao 37 foi instalada em um período de 48h após a instalação dos implantes. Seis meses após o período de cicatrização foi confeccionada uma prótese fixa metalocerâmica.