

## **138 - Tratamento cirúrgico de seqüela de trauma facial associado á reconstrução óssea alveolar para implantodontia**

*CHIARELLI, Murillo; PEREIRA FILHO, Valfrido Antonio;*

*SCARTEZINI, Guilherme Romano; GABRIELLI, Marisa Aparecida Cabrini*

Os traumatismos faciais podem envolver os tecidos mole, ósseo e ou dentário. Dentre estes, destacamos as fraturas de terço médio da face envolvendo a maxila (fratura Le Fort I) e avulsão dentária com perda de substância óssea alveolar, originadas de impacto direto sobre esses ossos. Nas fraturas Le Fort I, a maxila é separada dos ossos adjacentes e projetada, geralmente, para posterior, proporcionando mordida aberta anterior. O traumatismo dento-alveolar com perda de substância óssea promove um defeito estético e funcional, com perda de altura e espessura óssea alveolar. Quando as fraturas não são tratadas em tempo hábil ocorre a consolidação em posição inadequada, promovendo a seqüela. O tratamento para a seqüela é o reposicionamento cirúrgico através de osteotomias ou próteses aloplásticas para os ossos da face e enxertia óssea associadas a implantes osteointegráveis para o rebordo alveolar perdido. Os autores discutirão as formas de diagnóstico e tratamento através do relato de um caso clínico de seqüela de fratura Le Fort I associada à perda de substância óssea em rebordo alveolar, bem como a reconstrução do mesmo.