

188 - Hemangioma capilar lobular: relato de caso

BANDÉCA, Matheus Coêlho; LIA, Raphael C. Comelli; PÁDUA, Joubert Magalhães de

O hemangioma é uma proliferação benigna dos vasos sanguíneos, sendo o tumor mais comum dos recém-nascidos e da infância, embora alguns casos acometam adultos. Em muitas situações, a lesão representa uma malformação, e não um neoplasma verdadeiro. O hemangioma capilar é o tipo mais comum de ocorrer, sendo de três a cinco vezes mais freqüente no sexo feminino. Este trabalho relata um paciente do sexo feminino, 58 anos de idade, que após apresentar recidiva da lesão referente à uma exérese feita em outro serviço cerca de um mês antes de nos procurar, apresentou-se na Clínica de Odontologia da UNAERP para um possível tratamento. A lesão estava localizada na comissura labial direita e apresentava como uma massa elevada e lobulada de pigmentação avermelhada, com cerca de 2,5 cm de diâmetro. Realizou-se exérese total da lesão com margem de segurança, e sutura oclusiva feita em planos. Os aspectos histológicos evidenciaram tecido epitelial pavimentoso estratificado com camada superficial ceratinizada e ou nucleada, apresentando área descontínua ulcerada com resíduo em superfície necrótico exsudativo fibrinóide, lamina própria de densidade colágena variável exibindo lóbulos de proliferação em padrão fibroangioblastico altamente vascularizado. Neste trabalho será discutido a incidência, características clínicas e tratamento.