

12 - Cisto linfoepitelial cervical: relato de caso clínico

*Marcos Vinícius Mendes DANTAS, Marisa Aparecida Cabrini GABRIELLI,
Eduardo de Castro SILVA JÚNIOR, Eduardo Hochuli VIEIRA*

O Cisto Linfoepitelial Cervical, também denominado Cisto da Fenda Branquial, é um cisto de desenvolvimento localizado na região lateral superior do pescoço. É considerado um cisto originário de remanescentes das fendas branquiais, porém, algumas teorias ainda consideram uma possível origem de remanescentes epiteliais da glândula parótida, aprisionados nos nódulos linfáticos dessa região durante a embriogênese. Essas lesões acompanham o músculo esternocleidomastóideo, sendo comuns na segunda e quarta décadas de vida, e apresentam-se como uma massa mole e flutuante, podendo variar de 1 a 10 cm de diâmetro, geralmente indolor. Entretanto, quando relacionado a infecções secundárias, podem ocasionar dor ou sensibilidade. Histologicamente, nota-se uma cápsula fibrosa revestida por epitélio pavimentoso estratificado, queratinizado ou não, com tecido linfóide ocupando grande parte da cápsula. Seu tratamento é feito através da remoção cirúrgica e a recorrência da lesão ou a transformação maligna são raras. O objetivo deste trabalho é revisar a literatura atual sobre o Cisto Linfoepitelial Cervical e relatar um caso clínico de paciente de 14 anos, portador de Cisto localizado na região lateral superior esquerda do pescoço, onde o tratamento cirúrgico foi realizado.

Palavras-chave: *Cisto; linfoepitelial; cervical.*