

19 - Cirurgia de dente supranumerário incluso em odontopediatria: qual o momento ideal para sua realização?

*Francielle NESSO, Alexandre Paes de CAMARGO, Camila Braga NAVARRO,
André Lorenço ZUCHINNI, Vlamir Oliveira da SILVA, Luis José FLORIAM*

A erupção dos incisivos centrais superiores permanentes é um processo fisiológico e se dá por volta dos 7 anos de idade. Entretanto, podem ocorrer transtornos durante a erupção desses dentes, como a impaction, a erupção ectópica e a erupção de um dos incisivos sem o acontecimento semelhante com o seu homólogo. Por se tratar de alterações ocorridas em crianças, o Odontopediatra tem a obrigação de diagnosticar essas possíveis alterações, com o intuito de detectar o provável agente etiológico. Os mais comuns são os odontomas, os dentes supranumerários, a fibrose gengival, a dilaceração, a agenesia e o cisto de erupção. No caso de dentes supranumerários, a conduta a ser adotada pode não ser uma cirurgia imediata, e sim uma criteriosa avaliação dos riscos e benefícios inerentes à sua presença. A avaliação das estruturas anatômicas, tais como o estágio de formação radicular do supranumerário e dos dentes vizinhos, seio maxilar e até mesmo dos tecidos moles que recobrem a região e também a possibilidade de colaboração do paciente em função de sua idade. O objetivo deste trabalho é apresentar a cirurgia de dente supranumerário incluso em uma criança de 7 anos de idade, tecendo considerações à respeito do momento adequado para a realização da cirurgia.