

20 - Colagem de fragmento: uma opção estética para o restabelecimento do remanescente dentário

Juliana DEL VECCHIO, Nancy Tokomo SACONO, Angela Cristina Cilense ZUANON

Uma das causas mais comuns da perda da estrutura dental sadia em crianças é o trauma dental. A maior prevalência dos traumas ocorre nos dentes permanentes, especialmente nos incisivos centrais superiores, e em muitos casos a fratura envolve somente esmalte e dentina, sem exposição pulpar. Nestes casos, uma das alternativas de tratamento é utilizar o fragmento dental recuperado para restaurar o remanescente através da colagem utilizando sistemas adesivos e resinas compostas. Esta técnica é considerada extremamente conservadora, pois devolve a morfologia e contorno original da coroa dentária fraturada sem a necessidade de utilizar grande quantidade de material restaurador, além de contribuir emocionalmente para a recuperação da criança após o trauma. Outra grande vantagem desta técnica é sua execução fácil e rápida, permitindo excelentes resultados estéticos. Neste trabalho, apresentamos um relato de caso clínico de fratura coronária de incisivo central superior após traumatismo dentário, onde foi realizada a colagem do fragmento dental, bem como uma revisão de literatura sobre o assunto.

Palavras-chave: *Colagem dentária; estética dentária; dentística operatória.*