

29 - Chupeta ortodôntica e mordida aberta anterior

Ana Cristina de RESENDE, Elcilaine AZEVEDO, Angela Cristina Cilense ZUANON

A sucção de chupeta é um dos hábitos orais sem fins nutritivos mais frequentes podendo provocar maloclusões, sendo a mordida aberta anterior, a mais encontrada. Alguns autores relatam que o bico ortodôntico é o que melhor se adapta na boca da criança e causa menores alterações na oclusão quando comparado ao bico convencional. Foram avaliadas crianças de 0 a 5 anos da Clínica Infantil da Faculdade de Odontologia de Araraquara (SP), que possuíam o hábito de sucção de chupeta. Foram examinadas 72 crianças e divididas em dois grupos: chupeta convencional (A1) e ortodôntica (A2). Quanto ao tempo de uso, 67% e 61% das crianças que usaram chupeta A1 e A2 respectivamente, o fizeram por quatro anos ou mais. Quanto à frequência pode-se observar que no grupo A1 e A2, 87% e 57% respectivamente, utilizaram muito frequentemente a chupeta. Pode-se observar que não houve diferença estatisticamente significativa entre chupetas ortodônticas e convencionais quando se considerou mordida aberta anterior ($p = 0,378$), mordida cruzada ($p = 0,473$) e classificação de Angle ($p = 0,872$). Pode-se concluir que se a utilização da chupeta foi inevitável, a mãe da criança poderá optar por convencional ou ortodôntica, pois as mesmas não apresentam diferenças quanto as alterações estudadas.

Palavras-chave: *Mordida aberta; hábito; chupeta.*