

42 - Má oclusão de cl II: verificação da qualidade do tratamento em relação ao tipo de planejamento

*Marcus Vinicius Pinheiro de MAGALHÃES, Carla Maria Melleiro GIMENEZ,
André Pinheiro de Magalhães BERTOZ, Carlos Eduardo SHIMABUCORO,
Leopoldino CAPELOZZA FILHO*

A Cl II divisão 1 é um dos problemas freqüentes na rotina ortodôntica, havendo em muitos casos necessidade de extração e/ou expansão. Objetivo desta pesquisa foi avaliar de forma crítica os resultados obtidos neste tipo de má oclusão evidenciando os planejamentos instituídos. Foram selecionados 121 pacientes com má oclusão de Cl II divisão 1 e submetidos ao tratamento, com idade média de 13 anos. A amostra foi dividida em grupos de extração, expansão ou ambos. Foi utilizado como critério as 6 chaves de oclusão de Andrews, sendo que se todas fossem atingidas o critério seria ótimo, até 2 critério bom, até 3 critério regular e mais do que 3, ruim. Os resultados mostraram que houve maior freqüência de critérios ótimos (28,93%) e bons (35,54%) do que regulares (33,88%) e ruins (1,65%), independentemente da forma de tratamento instituído, o que foi estatisticamente significativo (teste Qui quadrado). Concluiu-se que se obteve maior freqüência de sucesso do que insucesso nos resultados do tratamento ortodôntico da má oclusão de Classe II divisão 1, independente da indicação de expansão e/ou extração, sugerindo que a obtenção de bons resultados depende de um planejamento adequado.

Palavras-chave: *Cl II divisão I; planejamento; ortodontia.*