

101 - Reabilitação total inferior com utilização de implantes Starumann e confecção de prótese total fixa imediata

*Gustavo Augusto Grossi de OLIVEIRA, Andréa Guedes Barreto GONÇALES,
Vanessa Barbosa da SILVA, Paulo NARY, Eduardo Sanches GONÇALES*

Com o desenvolvimento da Implantodontia, a Odontologia conquistou uma valiosa ferramenta na reabilitação de pacientes com ausência de elementos dentais, aumentando as possibilidades de restauração e benefício aos pacientes. O protocolo para tratamento de pacientes desdentados totais inferiores preconizado por Branemark no final dos anos 70, vislumbrava um período de ausência de carga sobre os implantes que variava de 4 a 6 meses, decorrente da estabilidade inicial. Ainda nos anos 70, Schoreder definiu a osseointegração como uma anquilose entre o osso e o titânio e, a partir desse estudo, desenvolveu-se o sistema Starumann. Nos anos 90, Schinitmam iniciou estudos com pacientes desdentados totais inferiores que foram reabilitados por meio da instalação de implantes e próteses tipo protocolo inferior, porém com carga imediata, eliminando, portanto, o período de osseointegração preconizado por Branemark. Os autores apresentarão caso clínico de um paciente com indicação de exodontia total inferior, reabilitado com prótese tipo protocolo inferior, por meio da utilização de implantes Starumann.

Palavras-chave: *Implantes dentários; cirurgia oral; prótese.*