

113 - Odontalgia por trauma oclusal

*Juliana HOTTA, Marcela Sollia SOARES, Gustavo André Carrara PORTES,
Cinara Maria CAMPARIS*

O trauma oclusal ocorre devido a forças excessivas produzidas por hábitos parafuncionais como o bruxismo ou por interferências oclusais, provocando dano aos tecidos periodontais, ATM, músculos da mastigação, polpa dentária e osso alveolar. Na presença de equilíbrio oclusal, ocorre uma intrusão fisiológica leve e temporária dos dentes, porém, com o trauma oclusal esse mecanismo é rompido, provocando o aparecimento de sinais e sintomas como: mobilidade dentária, dor dentária na mastigação e à percussão e, radiograficamente, perda da lâmina dura, variação na espessura da membrana periodontal e reabsorção óssea. A odontalgia de origem periodontal provocada pelo trauma oclusal é uma dor somática profunda do tipo músculo-esquelética, relacionada com a função biomecânica, de localização mais precisa que a dor de origem pulpar e que responde de forma proporcional e gradual ao estímulo. Como sinônima para a odontalgia de origem periodontal, são utilizados os termos pericementite apical aguda e pericementite sem envolvimento pulpar. O tratamento consiste no ajuste da oclusão, uso de placas oclusais, prescrição de analgésico/antiinflamatório e aplicação de anestésico local associado a corticosteróide.

Palavras-chave: *Oclusão dentária traumática; odontalgia; pericementite.*