

121 - Cefaléia tipo rebote e seu relacionamento com as DTM e cefaléias crônicas

*Andrea MASELLI, Mercedes Marçal Marques GOUVÊA, Paula Volpato SANITÁ,
Francisco Guedes Pereira de ALENCAR JUNIOR*

A Cefaléia do tipo rebote é uma cefaléia secundária geralmente considerada como uma complicação de uma cefaléia pré-existente, como a Cefaléia do tipo tensional ou a Enxaqueca. Sua etiologia está associada ao abuso de medicações (analgésicos comuns, antiinflamatórios ou medicações específicas para enxaqueca). Tem a característica de aumentar e diminuir ao longo do dia e piorar se a medicação for interrompida. Nesse caso, a medicação é mais um fator etiológico contribuinte na manutenção do quadro de cefaléia crônica e este quadro clínico é freqüentemente encontrado em pacientes com diagnóstico de dor miofascial associada. Estudos mostraram que, além de medicações, o abuso de certas substâncias, como cafeína, tabaco e álcool, também está associado ao aparecimento de cefaléia do tipo rebote. O presente trabalho tem por objetivo relatar dois casos clínicos de pacientes portadores de Cefaléia do tipo rebote com fatores etiológicos relacionados tanto ao abuso de medicamentos quanto ao de substâncias, expondo ainda o tratamento e a conduta clínica selecionados para cada caso e a evolução do quadro clínico de cada paciente.

Palavras-chave: *Cefaléia; rebote; dor miofascial.*