

157 - Tracionamento de canino utilizando a técnica do arco segmentado

*Fabio Augusto Doria de OLIVEIRA, Luiz Gonzaga GANDINI JUNIOR,
Mila Leite de MORAES, Rafael Gonçalves AZEREDO, Luiz Guilherme Martins MAIA*

Durante a rotina do consultório odontológico, não é raro os ortodontistas se depararem com dentes não irrompidos ou posicionados ectopicamente. Estas casualidades são observadas com mais frequência na região dos caninos superiores, terceira molares e na região ântero-superior. A presença do canino superior, além de contribuir para a estética, proporciona uma harmonia entre o segmento anterior e posterior do arco dentário, sendo considerado o elemento chave para o estabelecimento da harmonia oclusal. Vários são os motivos que levam à existência desta situação clínica, dentre eles destaca-se a falta de espaço na arcada, hereditariedade, traumatismo, dilaceração, anquilose, fissura alveolar e agenesia de incisivos laterais. O tratamento do dente não irrompido requer um bom senso do profissional na decisão da terapêutica eleita. Relataremos o tracionamento de um canino superior direito, utilizando a técnica do arco segmentado, proporcionando desta maneira um maior controle do sistema de força.

Palavras-chave: *Tracionamento; arco segmentado; ortodontia.*