

12 - Perda precoce de incisivos decíduos superiores: alternativa de reabilitação

*Ana Bárbara de Araújo LOIOLA, Ângelo Vicentini LOIOLA,
Ana Luísa Botta Martins de OLIVEIRA, Lívia Etchebehere de LOIOLA,
Rita de Cássia Loiola CORDEIRO*

Os traumatismos, reabsorção prematura das raízes dentárias, extrações antecipadas e cárie são os principais fatores etiológicos das perdas precoces dos dentes decíduos. A perda de espaço na região de incisivos decíduos é pouco freqüente e alguns autores acreditam que essa perda é acompanhada por um desvio da linha média anterior e até mesialização dos dentes posteriores. O objetivo deste trabalho é relatar o caso clínico de paciente com perda precoce dos incisivos decíduos superiores devido à trauma, e a conduta clínica aplicada. Com a finalidade de reabilitação estética e funcional foi feito um aparelho removível utilizando as coroas dos dentes extraídos, que tiveram suas raízes cortadas e a polpa removida, sendo a cavidade pulpar preenchida com resina acrílica. Para a montagem desse aparelho foi realizada uma moldagem da arcada superior e confecção de uma guia de cera para determinar a linha do sorriso, indicando a altura em que as coroas deveriam ser colocadas. Cabe salientar a importância do exame clínico, radiográfico e de modelos detalhados, para avaliação do tratamento adequado. Pode-se concluir que o uso de mantenedor de espaço na região anterior, cumpriu seu papel com efeito funcional, estético e psicológico.

Palavras-chave: *Trauma; mantenedor de espaço; reabilitação.*