

14 - Colagem de fragmento dentário como alternativa de tratamento para as fraturas corono-radiculares

Ana Livia Gomes CORNÉLIO, Juliana Oliveira GONDIM,

Bruna Carolina BOCHIO, Elisa Maria Aparecida GIRO

As fraturas coronárias são ocorrências freqüentes em dentes permanentes, entretanto as do tipo corono-radiculares são pouco comuns. Estes tipos de injúria envolvem esmalte, dentina e cimento, e podem ou não ter exposição da polpa. Dependendo do grau da extensão subgingival da linha de fratura e da existência do fragmento dentário, o dente pode ser restaurado por meio da colagem do fragmento. Este trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de fratura corono-radicular com exposição pulpar de incisivo central superior permanente, abordando as características clínicas e radiográficas, conduta terapêutica e a importância do acompanhamento clínico e radiográfico periódico do dente traumatizado. Neste caso, como a procura por tratamento foi imediata, realizou-se uma pulpotomia e, devido o nível da fratura estar subgingival e acima da crista óssea marginal, a colagem transcirúrgica do fragmento foi o tratamento de eleição. Pode-se concluir que em caso de fratura corono-radicular esta técnica é uma alternativa viável para restabelecer a forma, função e estética do elemento dentário, além de ser conservadora, de baixo custo e de grande aceitação por parte dos pacientes e dos seus responsáveis.

Palavras-chave: *Fraturas dos dentes; dentição permanente; colagem dentária; odontopediatria.*