

26 - Alterações de mucosa em pacientes portadores de diabetes mellitus

*Andressa Vilas Boas NOGUEIRA, André Luiz dos SANTOS,
Elaine Maria Sgavioli MASSUCATO, Silvana Regina Perez ORRICO*

Existe pouca informação na literatura quanto às alterações de mucosa bucal mais frequentes em indivíduos com Diabetes mellitus. O objetivo desse estudo foi apresentar as alterações de mucosa bucal e alguns dados correlatos em um grupo de pacientes portadores de diabetes. Foram avaliados 142 pacientes e levantados dados pessoais e relativos ao diabetes. A mucosa bucal foi avaliada por um examinador treinado quanto à presença de alterações. Os dados foram arquivados e analisados pelo programa EpiInfo 6.04b e os resultados obtidos por meio de análise simples de porcentagem. Do total da amostra, 57,8% eram mulheres, 81,7% tinham entre 36 e 65 anos e 88% apresentavam alguma alteração de mucosa. Destes, 77,6% tinham diabetes tipo 2 com tempo de duração abaixo de 11 anos e 54,8% eram compensados. Quanto às medicações, 74,4% faziam uso contínuo, sendo 61,6% de hipoglicemiantes e 55,2% anti-hipertensivos. As alterações de mucosa mais prevalentes foram: queilite actínica (18,9%), língua saburrosa (15,8%) e fissurada (11,6%), varizes linguais (11%) e candidose (6,5%). Conclui-se que os indivíduos com diabetes podem apresentar alterações de mucosa bucal, sendo importante sua detecção e possível correlação com a condição sistêmica para prevenção e acompanhamento.

Palavras-chave: *Diabetes mellitus; diagnóstico bucal; medicina bucal.*