

38 - Bruxismo em odontopediatria

*Cármem Regina COLDEBELLA, Paulo Domingos André BOLINI,
Angela Cristina Cilense ZUANON, Alan Augusto Kalife COELHO,
Simone Di Salvo MASTRANTONIO, Ana Maria MINARELI-GASPAR*

O hábito parafuncional de apertar ou ranger os dentes, conhecido como bruxismo, faz parte de um conjunto de problemas designado como disfunções da Articulação Temporomandibular. É caracterizado por movimentos não funcionais da mandíbula de forma consciente ou inconsciente, de maneira contínua ou periódica, havendo ou não presença de ruídos. Ocasionalmente por repetidas e contínuas contrações dos músculos elevadores da mandíbula, provocam uma força do contato dentário muito maior do que a atividade funcional, o que associado a ausência dos reflexos protetores do sistema neuromuscular poderá causar colapso das estruturas envolvidas. Embora duração e frequência do hábito sejam bastante variáveis tanto de pessoa para pessoa como em um mesmo indivíduo, pode ser considerado comum na infância afetando a criança em qualquer faixa etária. Seu diagnóstico é de fundamental importância para a prevenção de danos às estruturas a ele relacionadas. Assim este trabalho teve como objetivo proporcionar, através de uma revisão de literatura, uma visão geral do assunto ressaltando sua etiologia multifatorial, sinais e sintomas apresentados bem como os variados tratamentos disponíveis.

Palavras-chave: *Bruxismo; odontopediatria; dentição decídua.*