

44 - Prevenção de complicações decorrentes do mesiodens: papel do diagnóstico precoce e remoção cirúrgica

*Cássia Cristina Nogueira MARTINS, Elisa Maria Aparecida GIRO,
Ana Luísa Botta Martins de OLIVEIRA, Caio Sérgio Botta Martins de OLIVEIRA,
Érika Botelho JOSGRILBERG, Josimeri HEBLING*

As malformações durante o estágio de iniciação e proliferação do desenvolvimento dentário podem resultar em anomalias, dentre as quais se destacam os dentes supranumerários. O mesiodens é o dente supranumerário mais comum e está localizado na região ântero-superior, entre os incisivos centrais superiores, apresentando geralmente forma conóide com raiz curta e na maioria dos casos encontra-se impactado. A prevalência maior é para o gênero masculino sobre o feminino e nas dentições é maior para a mista e/ou permanente sobre a decídua. O presente trabalho propõe-se a relatar casos de pacientes da Clínica Infantil da Faculdade de Odontologia de Araraquara-UNESP, que apresentavam esta anomalia associada à formação de diastemas entre os incisivos centrais ou impactação de dentes permanentes, sendo submetidos ao tratamento cirúrgico. O objetivo da remoção deste supranumerário é de prevenir e possibilitar o tratamento de complicações que podem ser ocasionadas pela sua persistência como: reabsorção radicular do dente vizinho, maloclusão, formação de cistos, neoplasmas, entre outros. Desta forma, cabe salientar a importância do diagnóstico precoce e tratamento adequado para estas alterações.

Palavras-chave: *Dente supranumerário; mesiodens; cirurgia.*