

55 - Manifestações bucais em pacientes pediátricos imunocomprometidos (HIV positivos – aids)

Dayane Souza MARQUES, Elisa Maria Aparecida GIRO, Cyneu Aguiar PANSANI

A Síndrome da Imunodeficiência adquirida (AIDS) é uma infecção cujo agente etiológico é o vírus da imunodeficiência humana (HIV). Esta doença caracteriza-se por imunossupressão profunda, principalmente dos linfócitos T CD4, levando ao surgimento de diversas infecções oportunistas. A transmissão do vírus HIV é influenciada por diversas variáveis e as três formas principais de transmissão são: através do contato perinatal de mães infectadas para suas crianças (transmissão vertical), através de contato sexual e da exposição ao sangue e produtos sanguíneos infectados. Dentre as infecções oportunistas, as manifestações orais aparecem como um dos primeiros sintomas clínicos sendo as mais frequentes: candidose, Sarcoma de Kaposi, leucoplasia pilosa, infecção pelo herpes simples e quelite angular. Essas lesões, não ocorrem somente, devido ao baixo número de linfócitos T CD4, mas também, pela presença de xerostomia e pela ausência de terapia anti-retroviral. Este trabalho objetiva a abordagem de algumas manifestações orais associadas à infecção pelo HIV, salientando importância de uma adequada correta anamnese e exame clínico, para o diagnóstico e tratamento precoce, impedindo a disseminação de lesões de origem infecciosa para outras regiões do organismo.

Palavras-chave: *Síndrome da imunodeficiência adquirida; criança; manifestações bucais.*