

56 - Grade palatina no tratamento da mordida aberta anterior dentária

Débora da Silva Lopes SALLES, Dirceu Barnabé RAVELLI,

Luana Paz Sampaio DIB, Savana de Alencar MAIA, Denise Rocha GOES

A mordida aberta anterior é uma das más oclusões de maior comprometimento estético-funcional, caracterizando-se pelo trespasse vertical negativo e dentes posteriores em oclusão. Sua etiologia é bastante variável, envolvendo hábitos bucais deletérios (sucção digital ou chupeta), amígdalas hipertróficas, respiração bucal, entre outros. O tratamento envolve uma abordagem multidisciplinar e depende da etiologia, idade de intervenção, bem como das características individuais de cada paciente. A mordida aberta anterior dentária geralmente apresenta prognóstico favorável, independente da mecanoterapia aplicada. Já a mordida aberta anterior esquelética requer o controle do crescimento vertical facial e a intrusão dos dentes posteriores, seja através de forças ortodônticas ou pelo reposicionamento das bases apicais, através da cirurgia ortognática. O objetivo deste trabalho é apresentar o caso clínico da paciente L.R., 9 anos, gênero feminino, que apresentava mordida aberta anterior dentária, associada à hábito de sucção de chupeta e que foi tratada com o auxílio da grade palatina fixa.

Palavras-chave: *Grade palatina; má oclusão; mordida aberta.*