

## **65 - Hemangioma cavernoso labial em criança: relato de caso clínico**

*Érika Dorigatti de ÁVILA, Marisa Aparecida Cabrini GABRIELLI,  
Nicolau CONTE NETO, Eduardo Hochuli VIEIRA*

Hemangioma são tumores benignos da infância que se caracterizam por uma fase de crescimento rápido com proliferação de células endoteliais, ocorrendo em 10 a 12% das crianças com um ano de idade. Sua localização mais comum é nos lábios, na língua, mucosa jugal e no palato. Em geral, a ausência ao nascimento auxilia no diagnóstico diferencial de malformação vascular. Aproximadamente 50% dos casos de hemangioma mostram completa resolução e 90% deles resolvem-se até aos nove anos de idade. As complicações ocorrem em apenas 20% dos casos onde o problema mais comum é a ulceração com ou sem infecção. O tratamento depende da localização, do tamanho da lesão, da idade do paciente e de seu estágio evolutivo. A cirurgia, geralmente é indicada quando não há resposta aos tratamentos sistêmicos ou por razões estéticas, podendo ser empregada sob forma de exérese simples com ou sem plástica. Apresentaremos um caso de hemangioma cavernoso labial em uma criança de 4 anos de idade, que devido ao tamanho da lesão, foi submetido a 3 sessões de esclerose vascular e após estas sessões submetidas à exérese da lesão, com acompanhamento clínico de 4 anos de pós-operatório.

**Palavras-chave:** *Tumor benigno; hemangioma; tumor vascular.*