

126 - Hipoplasia de molares e incisivos (*Molar Incisor Hypomineralisation- MIH*); relato de caso clínico

***Luciana Fernandes BALLAN, Sâmia Cruz Tfaile CORBI, Lourdes dos SANTOS-PINTO,
Rita de Cássia Loiola CORDEIRO***

Hipoplasia de molares e incisivos é definida como uma hipomineralização envolvendo de um a quatro primeiros molares permanentes e/ou incisivos. Clinicamente observa-se um padrão atípico de manifestação da alteração do esmalte com linhas opacas, desenvolvimento rápido de lesões de cárie e extrema hipersensibilidade ao ar, frio, calor e estímulos mecânicos. O tratamento é dificultado pela pouca eficiência da anestesia e da adesividade do material restaurador ao esmalte. Apresentamos um quadro de MIH com lesões incipientes nos incisivos e severas nos molares que, frente a grande sensibilidade foram inicialmente tratados com aplicações tópicas de NaF 5%. Posteriormente, os molares superiores receberam restaurações temporárias de cimento ionomérico. Diante da presença dos sulcos escurecidos e lesões de cárie, uma das opções de tratamento nos dentes 36 e 46 foi a utilização das pontas CVDentus para confecção dos preparos cavitários e restaurações com cimento ionomérico. Apesar do paciente ser pouco cooperativo, o tratamento foi realizado sem a necessidade de anestesia infiltrativa. Consideramos que o sucesso do caso deve-se à seqüência de procedimentos realizados, facilidade da técnica de preparo cavitário e possibilidade de preservar o máximo de estrutura dentária sadia.

Palavras-chave: *Hipoplasia; CVDentus; preparo cavitário.*