

131 - Tratamento da hipoplasia de terço médio da face utilizando osteotomia Le Fort III modificada

*Maira Lupatelli MENDONÇA, Mario Henrique Arruda VERZOLA,
Roberto Henrique BARBEIRO*

Os pacientes portadores de má oclusão tipo classe III podem ter associado, a hipoplasia do terço médio da face. O diagnóstico pode ser feito pela análise facial e cefalométrica onde podem ser observados: a deficiência da área paranasal e antero-posterior do terço médio e excesso vertical da maxila. As deformidades dentofaciais quando acometem o terço médio da face exigem do cirurgião o uso de técnicas cirúrgicas não utilizadas como rotina no tratamento das alterações faciais. O planejamento para um tratamento cirúrgico integrado requer do profissional uma detalhada análise facial, avaliação cefalométrica e análise dos modelos de gesso montados adequadamente em articulador semi-ajustável. Desta forma para os casos de hipoplasia de terço médio da face, a associação da osteotomia Le Fort I para reposicionamento da maxila, associada a osteotomia Le Fort III modificada e osteotomia sagital bilateral do ramo mandibular, garantem resultados estéticos satisfatórios e estáveis. O objetivo deste trabalho será expor um caso clínico de hipoplasia do terço médio da face tratado com osteotomias Le Fort I para reposicionamento da maxila, osteotomia Le Fort III para reposicionamento da porção fixa do esqueleto facial e osteotomia sagital bilateral do ramo mandibular para correção mandibular.

Palavras-chave: *Hipoplasia; osteotomia; má oclusão.*