

149 - Tratamento cirúrgico de fibro-anquilose de ATM - relato de casos

*Mayko Naruhito TANABE, Marcelo Zillo MARTINI, Shajadi Carlos Pardo KABA,
Carlos Henrique HUEB, Elio Hitoshi SHINOHARA*

A anquilose da articulação temporomandibular (ATM) é a união intra-capsular do complexo disco-côndilo à superfície articular temporal levando a restrição dos movimentos mandibulares. Essa união pode ocorrer por meio de união fibrosa ou por fusão óssea entre côndilo, disco, fossa e eminência articular. A anquilose da ATM pode ser resultado de trauma, infecção, doenças auto-imunes e tratamento cirúrgico inadequado. O objetivo deste trabalho é apresentar relato de dois pacientes, um com história de trauma facial por queda de altura e fratura mandibular em parasínfise direita e intracapsular em côndilo esquerdo, referindo tratamento cirúrgico em parasínfise e conservador em côndilo; e outro sem etiologia definida. Ambos apresentavam restrição de abertura bucal e foram tratados no Serviço de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial do Conjunto Hospitalar do Mandaqui SUS/SP, localizado na cidade de São Paulo-SP. Por meio de exame clínico e imaginológico diagnosticou-se fibro-anquilose de ATM. Após exames laboratoriais e consentimento, optou-se por tratamento cirúrgico constituído por condilectomia alta por via endaural. Atualmente pacientes encontram-se em pós-operatório com restauração de abertura de boca. Dados associados à tática cirúrgica adotada, assim como detalhes do tratamento serão abordados na apresentação.

Palavras-chave: *Anquilose; ATM; condilectomia.*