

O.58 - Fibroma ossificante central: relato de caso clínico

Zagato NR, Souza EMC, Massucato SEM, Vieira EH, Dantas MVM

O fibroma ossificante central (FOC) apesar de ser incomum, é a lesão fibro-óssea mais freqüente, corresponde a uma neoplasia benigna, de crescimento lento e geralmente assintomático. O objetivo deste trabalho é apresentar o caso clínico de uma paciente melanoderma, 57 anos, com aumento de volume localizado no fundo de sulco do rebordo alveolar, na região dos dentes 24 e 25 (ausentes) estendendo-se até o dente 27, com expansão da cortical óssea vestibular, duro à palpação e recoberto por mucosa íntegra. Na radiografia panorâmica, periapical e oclusal, evidenciou-se área radiolúcida sem limites nítidos, com presença de pontos radiopacos difusos. Com o diagnóstico clínico de tumor odontogênico ou cisto, foi feito a punção aspirativa, onde não se obteve conteúdo líquido. Foi realizada biópsia incisional que possibilitou a identificação microscópica de fragmentos com grande número de fibroblastos, entremeados por matriz colagenosa, presença de tecido ósseo neoformado e formações calcificadas psamatóides definindo o diagnóstico de FOC. A paciente foi encaminhada ao serviço de cirurgia para remoção da lesão. Conclui-se que apesar de não haver relatos de transformação maligna do FOC, é importante o diagnóstico precoce evitando que estas lesões atinjam grandes tamanhos podendo comprometer estruturas anatômicas importantes.