

27-SPPG - Conduta após fratura radicular de remanescente dentário com uso de implante osseointegrável em função imediata

*Fernando Pozzi Semeghini GUASTALDI, Eduardo Hochuli VIEIRA,
Thallita Pereira QUEIROZ, Francisley Ávila SOUZA,
Mariliza Comar Astolpho de CARVALHO, Idelmo Rangel GARCIA-JUNIOR*

Os traumatismos dento-alveolares, especialmente aqueles que envolvem os dentes anteriores tem efeito desfavorável na função e estética do sistema estomatognático, afetando a auto-estima do paciente, interferindo em seu comportamento, prejudicando o sucesso pessoal e profissional. Dentre os traumatismos destaca-se a fratura radicular, uma injúria que envolve ligamento periodontal, cimento, dentina e polpa. Este tipo de fratura tem sua incidência aumentada quando o remanescente dentário é suporte para uma prótese fixa. Por outro lado, o alto índice de sucesso com o uso de implantes osseointegráveis, monitorizado por estudos longitudinais levou a algumas modificações no protocolo inicial, que incluem a instalação de uma fixação com reabilitação protética após um procedimento de exodontia em uma única sessão. O objetivo deste trabalho foi relatar o caso clínico de um paciente portador de fratura radicular no incisivo central superior após dez anos de uso de uma prótese fixa suportada por um retentor intra-radicular. Foi realizada a exodontia, instalação da fixação e confecção da prótese provisória sobre implante em uma única sessão, estando esta em função imediata. Conclui-se que a instalação de implantes com reposição protética imediatamente após a exodontia constitui um tratamento viável para raízes com fratura radicular.