

43-SPPG - Mordida aberta anterior de aparecimento tardio: relato clínico

*Priscila Vaz AYUB, Marília Sayako YATABE, Omar Gabriel da SILVA FILHO,
Tulio Silva LARA, Francisco Antonio BERTOZ*

A mordida aberta de caráter dento-alveolar apresenta prognóstico de tratamento favorável e pode ser abordada terapêuticamente desde a dentadura decídua. Apresenta um aspecto circular, localização restrita à região anterior e etiologia vinculada aos hábitos de sucção. O presente relato demonstra o aparecimento da mordida aberta anterior na dentadura permanente. Por apresentar associação com hábitos de sucção deletérios, a mordida aberta anterior dento-alveolar é mais comumente observada em crianças, o que torna este relato infrequente. O paciente R.B.T. apresentou-se no consultório em dois momentos diferentes: numa primeira consulta, com o trespassse vertical normal e 1 ano após, com uma mordida aberta anterior. Não é comum a manifestação da mordida aberta anterior a partir da dentadura permanente, no final da adolescência. O tratamento envolveu aparatologia fixa e uso de elásticos. Como regra, quanto mais circular e circunscrita aos incisivos, melhor o prognóstico de tratamento da mordida aberta dento-alveolar. Já uma mordida aberta mais retangular e difusa tem etiologia associada ao pressionamento lingual primário ou ao crescimento facial inadequado. O prognóstico de tratamento neste caso é desfavorável e exige exercícios fonoarticulatórios como coadjuvante da ortodontia para estabilidade pós-tratamento. Quanto mais para posterior se estender este tipo de mordida aberta, maior a dificuldade em tratá-la sem cirurgia ortognática. Devido às características morfológicas da mordida aberta apresentada neste relato clínico, o prognóstico de tratamento com ortodontia é favorável.