

54-SOG - Perfil do paciente com neuralgia trigeminal. Estudo clínico retrospectivo

Maria Cecília Querido OLIVEIRA, Rafael Akira MURAYAMA, Norberto Perri MORAES

A neuralgia trigeminal (NT) é uma condição dolorosa que afeta a região orofacial, geralmente unilateral, envolvendo uma ou mais divisões do nervo trigêmeo caracterizando-se por dor abrupta, intensa e de curta duração. É mais comum em mulheres acima dos 40 anos podendo ser idiopática ou estar associada a doenças de base. O tratamento pode ser medicamentoso e/ou cirúrgico. O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo revisivo de NT, num período de 11 anos, visando melhor conhecer o perfil clínico desses pacientes através de dados demográficos, sinais e sintomas, qualidade da dor, localização, áreas de ponto de gatilho de dor e resposta ao tratamento. Foram avaliados 27 pacientes com NT. Os resultados mais significativos foram: maior ocorrência em mulheres (59%), raça branca (62%), idade média 61 anos, dor tipo paroxística (100%), cronicidade média de 6 anos e intensidade média de dor 9 na Escala Visual Analógica (EVA). O ramo mandibular foi o mais acometido (65%) com ponto de gatilho próximo ao forame mentoniano. O tratamento inicial mais utilizado foi medicamentoso (anticonvulsivantes), sendo eficaz em 11 (40,7%) dos pacientes. Pode-se concluir que o perfil clínico dos pacientes deste estudo revelou maior acometimento de mulheres a partir da sétima década de vida, com dor paroxística de intensidade média 9 na EVA e no ramo mandibular. É responsabilidade do Cirurgião-Dentista é diagnosticar e orientar o paciente no tratamento da NT junto a equipe multidisciplinar.