

17-SPG - Granuloma piogênico

***Leonardo Augusto Santana LARA, Antonio Carlos MARQUETI, Thiago MATHEUS,
Renata Callestini FELIPINI, Alvimar Lima de CASTRO***

O granuloma piogênico é um aumento volumétrico nodular, de aspecto tumoral, de localização predominante na gengiva, podendo manifestar-se também nos lábios, língua e bochechas e áreas da mucosa bucal e pele. Mostra-se como um crescimento exofítico indolor, de consistência mole, geralmente pediculado, com início a partir de uma papila interdental, podendo atingir até 1,5 cm de diâmetro, manifestando-se mais freqüentemente e igualmente nas gengivas em pessoas do sexo feminino, de cor branca na faixa etária de 21 a 50 anos, sendo que o diagnóstico se baseia nos achados clínicos e histopatológicos com prognóstico favorável. Caso Clínico: paciente do sexo masculino, 13 anos, com lesão nodular na gengiva inserida da região anterior inferior da mandíbula na área de incisivos inferiores, de coloração róseo-avermelhada, apresentando forma retangular com aproximadamente 15 x 10 mm, tendo uma base de implantação séssil e consistência fibrosa. Como diagnóstico diferencial foi considerado a hiperplasia fibrosa inflamatória, leão de células gigantes periféricas e gengivite medicamentosa, sendo considerado como diagnóstico clínico para o caso a hiperplasia fibrosa inflamatória. Como conduta semiotécnica, realizou-se a biópsia excisional, confirmando o diagnóstico de granuloma piogênico, reforçando a necessidade do exame histopatológico para a definição do diagnóstico.