

19-SPG - Hiperplasia fibrosa inflamatória de Fórnix

*Nathalia Viana de Souza CRUZ, Marcell Moço SILVA, Pedro Lima RODRIGUES,
Renata Callestini FELIPINI, Alvimar Lima de CASTRO*

A Hiperplasia Fibrosa Inflamatória de Fórnix (HFIF) apresenta-se como um aumento volumétrico nodular alongado, localizado no fórnix vestibular inferior e/ou superior, ocasionalmente podendo localizar-se também mais para o rebordo alveolar ou mucosas labial ou jugal. Desenvolve-se em associação a fatores irritantes crônicos de baixa intensidade, como traumas mecânicos constantes provocados por próteses mal ajustadas, câmara de sucção, dentes fraturados ou restos dentários sobre a mucosa bucal. Caso clínico: paciente do sexo feminino, 56 anos, relatava dor na boca devido a uma carne esponjosa. Observou-se lesão localizada no rebordo alveolar inferior esquerdo de forma indefinida, tamanho aproximado de 2 cm, coloração rosa-avermelhada, limites definidos, superfície rugosa, mucosa adjacente eritematosa e base de implantação séssil. A anamnese foi direcionada para detecção de causas desencadeantes e o fator relevante foi o uso de prótese total. Com o diagnóstico clínico de HFIF, optou-se inicialmente pelo alívio da prótese para readaptação na boca após a remoção cirúrgica da lesão, encaminhando-se, a seguir, a paciente ao serviço de origem para confecção de nova prótese. A remoção da prótese por uma ou duas semanas, determina a diminuição do volume da lesão pela redução do componente inflamatório, favorecendo a sua remoção cirúrgica. Lesões iniciais pouco elevadas podem regredir com a simples suspensão do uso da prótese. O sucesso terapêutico depende da identificação e eliminação dos fatores etiológicos envolvidos.