

## **26-SPG - Hemangioma cavernoso**

***Estefani Maminis Soares COUTO, Marcell Moço SILVA, Marcelo Macedo CRIVELINI,  
Felipe Augusto da Silva NISHIMOTO, Karina Yuri KONDO, Alvimar Lima de CASTRO***

O termo hemangioma tem sido usado para descrever diversas anomalias vasculares de desenvolvimento. Caracteriza-se por uma lesão nodular proliferativa neoplásica benigna ou malformativa, constituída de vasos sanguíneos que ocorre em qualquer idade ou sexo. Caso clínico: o paciente do sexo masculino, 64 anos, apresentava nódulo no vermelhão do lábio inferior direito, de base sésil, de consistência mole, coloração arroxeada, com aproximadamente 0,5 cm. O diagnóstico foi favorecido utilizando-se semiotécnica da diascopia, onde a lesão se apresentou esbranquiçada quando pressionada a lâmina de vidro. A excisão cirúrgica da lesão foi o tratamento escolhido. Com base nos exames complementares e no resultado do exame histopatológico, confirmou-se o diagnóstico de hemangioma cavernoso. No pós-operatório de sete dias, observou-se que o tratamento cirúrgico se mostrou eficaz na resolução do caso. Como conclusão, consideramos que a participação do cirurgião-dentista na identificação de lesões bucais é importante, tanto no sentido preventivo como no adequado encaminhamento dos casos mais complexos.