

P.38 - Tratamento da mordida aberta anterior: relato de um caso clínico

Crescêncio M, Oliveira EA, Brentan C, Torres P, Nakao CY

A definição da mordida aberta anterior é uma má oclusão onde há ausência de contato entre os dentes anteriores quando os posteriores estiverem em oclusão, o qual se deve por inclinação excessiva para vestibular dos incisivos superiores ou supra oclusão dos dentes posteriores acompanhados ou não por alterações esqueléticas. A mordida aberta anterior provoca alterações estéticas, funcionais e fonéticas. A etiologia da mordida aberta anterior é multifatorial e dentre eles há: hereditariedade, presença de hábitos deletéricos, função ou tamanho anormal da língua, respiração bucal, padrão de crescimento vertical e as patologias congênitas ou adquiridas. A presença de hábitos bucais constitui uma interferência na erupção dental e desenvolvimento alveolar tratando-se de grande preocupação entre odontopediatras e ortodontistas. Os fatores que intensificam os danos causados pelos hábitos de sucção de dedo ou chupeta e interposição lingual são duração, frequência e intensidade. O sucesso do tratamento está ligado à remoção da etiologia do problema que melhora significativamente a mordida aberta anterior dependendo sempre da época da intervenção. Neste trabalho será apresentado um caso clínico de mordida aberta anterior causada por hábito de sucção de chupeta.