

P.41 - Dente supranumerário associado a impactação de incisivo central permanente - relato de caso clínico

Rossi MFS, Pontes MEC, Tanaka MH, Giro EMA, Gandini Jr. LG

A maioria dos dentes supranumerários desenvolve-se durante as duas primeiras décadas de vida e pode afetar tanto a dentição decídua quanto a permanente. Durante a odontogênese, ocorre um hiperdesenvolvimento da lâmina dental devido a fatores hereditários ou ambientais, que resulta na formação de dentes supranumerários. O tipo mais comum de supranumerário é o mesiodens, o qual apresenta como características clínicas a forma conóide e a raiz curta. Geralmente, a presença de dentes supranumerários determina a impactação de dentes permanentes. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de uma paciente de 10 anos de idade, na qual durante o exame clínico observou-se a presença de um dente supranumerário erupcionado e no exame radiográfico detectou-se além do incisivo central superior permanente impactado, a presença de outro supranumerário (mesiodens). A conduta clínica neste caso envolveu a cirurgia e a ortodontia, com planejamento de extração do supranumerário e do mesiodens e colagem de um acessório ortodôntico no incisivo central permanente para possibilitar seu tracionamento. Ressalta-se, neste caso a importância do diagnóstico precoce da presença de dentes supranumerários na prevenção da instalação de problemas oclusais, bem como, a importância do tratamento multidisciplinar quando estes problemas já estão instalados.