

P.10 - Restauração de dentes anteriores decíduos: uma proposta de tratamento

Silva LACB, Humel GS, Paies MB, Conte-Neto N, Carvalho WRS

iviaamato@hotmail.com

Em geral, as indicações para restaurar incisivos decíduos incluem: cáries, traumatismos ou defeitos do desenvolvimento dental. Com frequência colocam-se restaurações classe III e IV de resinas compostas nos dentes anteriores decíduos, mas quando há grande perda de estrutura dental, a cobertura total com uma coroa representa o tratamento de excelência para estes casos, e dentre suas indicações destacamos os dentes anteriores com extensas lesões interproximais, tratados endodonticamente, fraturados e com perda considerável de estrutura, dentes com alteração de desenvolvimento, dentes pigmentados e com zonas extensas de descalcificação cervical. A proposta deste trabalho é apresentar um caso clínico, de um paciente do gênero masculino, com 6 anos de idade, atendido em clínica privada, com terapia pulpar e extensa perda de estrutura dental provocada por cárie. A restauração foi feita com resina composta e pinos pré-fabricados em função da retenção necessária devido a insuficiência de estrutura dental coronária para sustentar o procedimento restaurador. A reconstrução dos dentes anteriores decíduos é fundamental devido a recuperação da estética, função mastigatória, bem como evita a instalação de hábitos viciosos, distúrbios de fonação e problemas de ordem psicológica por parte do paciente.