

O.48 - Alteração tecidual em língua compatível com lesão liquenóide associada à reação a metais utilizados em próteses fixas

Brito CAB, Silva RHBT, Reis JMSN, Massucato EMS, Pinelli, LAP, Faria IR

reginats@foar.unesp.br

A paciente AMDG, 54 anos, procurou a faculdade de odontologia de Araraquara – UNESP, após duas cirurgias para remoção de carcinoma epidermóide na língua, com solicitação médica de remoção de prótese fixa metálica plástica. A hipótese diagnóstica era de lesão liquenóide associada ao metal não nobre da prótese fixa mandibular da paciente como fator predisponente. Após exames clínicos e complementares, verificou-se arco maxilar reabilitado com prótese total, arco mandibular reabilitado com prótese parcial fixa e presença de “mancha branca” assintomática na região lateral direita da língua. Considerando-se o histórico e a solicitação médica decidiu-se substituir a prótese fixa por prótese implanto suportada, como opção às convencionais, que pode proporcionar ótimos resultados frente à diversidade de sistemas e materiais disponíveis. É de suma importância relatar que são raros os relatos de reações teciduais liquenóides ao titânio e às ligas de titânio ou às cerâmicas utilizadas na confecção das próteses sobre implantes. Espera-se como benefício oriundo do diagnóstico precoce que, além da reabilitação estética e funcional, a paciente apresente melhora ou estagnação do quadro de alteração tecidual presente. Será realizada preservação em longo prazo para a verificação dos sinais e sintomas presentes na região acometida.

Palavras-chave: *Líquen plano bucal; ligas metálicas; prótese parcial fixa.*