

O.27 - Opção de técnica de cirurgia plástica periodontal para o tratamento de retrações gengivais em mandíbula

Bonardi JP, Maia LP, Sturaro RH, Novaes Jr AB, Reino DM

joão.bonardi@usp.br

Retrações gengivais acometem grande parte da população e podem causar hipersensibilidade dentinária e maior incidência de lesões cáries, afetando a estética do sorriso, fazendo com que haja maior procura por tratamentos de recobrimento radicular. Foi descrita uma modificação da técnica de retalho avançado coronalmente para o tratamento de retrações múltiplas, através do uso de enxerto de tecido conjuntivo, sem o emprego de incisões relaxantes. Esta variação visa o aumento em espessura da gengiva inserida e aumento da previsibilidade do recobrimento radicular. O objetivo deste relato de caso é mostrar o emprego desta técnica no tratamento de retrações gengivais múltiplas em mandíbula. Paciente, apresentando retrações múltiplas associadas a abrasões dentárias, após receber raspagem supragengival, profilaxia, instrução de higiene bucal e quando obtido o índice de placa inferior a 20%, recebeu tratamento cirúrgico. Avaliações foram feitas com 7, 15, 30 dias e após 6 meses. Com o emprego da técnica modificada, associada ao uso de enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, houve um satisfatório recobrimento radicular das áreas tratadas com a formação de gengiva inserida, queratinizada e de boa espessura, promovendo a satisfação do paciente.

Palavras-chave: *Retrações gengivais; cirurgia periodontal; hipersensibilidade dentinária.*