

## **O.25 - Perfil dos pacientes atendidos no Grupo de Assistência, Pesquisa e Estudo em Dor Orofacial e Cefaléia da FOAr-UNESP**

***Bonafé FSS, Fernandes G, Franco AL, Gonçalves DAG, Camparis CM***

*fernandassbonaf@foar.unesp.br*

Disfunção temporomandibular (DTM) é um termo coletivo para os problemas clínicos que envolvem a musculatura da mastigação, articulação temporomandibular e estruturas associadas. O objetivo deste estudo foi analisar dados sociodemográficos e a prevalência da DTM nos indivíduos que procuraram o Grupo de Assistência, Pesquisa e Estudo em Dor Orofacial e Cefaléia (GAPEDOC), entre 2007 e 2009. A partir de um banco de dados, foram apuradas as informações sociodemográficas e do diagnóstico da DTM, que foi obtido utilizando-se o Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD). Realizou-se estatística descritiva e estudo de associação por meio do teste de qui-quadrado. Dos pacientes, 83,7% eram mulheres e a idade média era de  $37,6 \pm 12,7$  anos. Afirmaram ter bruxismo do sono 59,3%, apertar os dentes na vigília, 61,8% e ter cefaléia, 79,2%. A prevalência de DTM foi de 82,1%. Verificou-se associação significativa entre o diagnóstico de DTM e o gênero, o bruxismo, o apertamento na vigília e a cefaléia ( $p = 0,000$ ). A maioria dos indivíduos que procura tratamento para dor no GAPEDOC apresenta DTM, e esta alta prevalência de disfunção e da dor na região orofacial exige dos profissionais preparo, treinamento e conhecimento para realizar o diagnóstico e o tratamento adequados.

**Palavras-chave:** *Dor facial; cefaléia; sexo.*